



ADÖLESAN İNDİREKT İNGÜİNAL HERNİLERİNDE YÜKSEK LİGASYONUN UZUN DÖNEM SONUÇLARI

Selay Tay, Ali Ekber Hakalmaz, Ali Sezer*, Beste Girgin, Ayşe Kalyoncu Uçar**,

Rahşan Özcan, Gonca Topuzlu Tekant

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı,

* Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, **Radyoloji Anabilim Dalı



- 2012–2022
- Geriye dönük
- 12-18 yaş arası
- İntraoperatif ve geç dönem bulgular

Dışlama kriterleri: Veri eksikliği, direkt herni, puberte öncesi dönemde olmak, bağ dokusu hastalığı, inmemiş testis eşlik etmesi, sentetik yama veya farklı cerrahi yöntemler ile onarım.


Teknik: İnguinal kesi, eksternal oblik kas aponörozunun açılması, internal ring seviyesinde poliglaktin sütürler ile yüksek bağlama, Ferguson metoduna uygun internal oblik kasın inguinal ligamana pilikasyonu



N:22

E/K	2,66 (16/6)
Sağ / Sol / Bilateral	13 / 7 / 2
Median ameliyat yaşı	15 yaş (12-17)
Median takip süresi	6,9 yıl (3-13)

- Ağrı (n:3)
- Nüks (-) / Direkt herni (-)



SONUÇ: Yüksek ligasyon, adölesanların indirekt inguinal hernilerinde, uzun dönem izlemlerde nüks oranı düşük bulunan güvenilir ve etkin bir yöntemdir.