

Superior sternal kleftte primer onarım: Olgu sunumu

P Yorulmaz*, ZM Gökbuget*, S Kuruğöglü**, F Öztunç***, R Özcan*

*İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD

**İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı

***İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Kardiyolojisi BD

Olgu: 4 aylık E hasta, 36 GH, Antenatal tanı yok


Doğum sonrası → Superior Sternal Kleft



Solunum sıkıntısı ve prematürite →
24 gün YBÜ

EKO → Normal

4 aylıkken kliniğimize başvuru




BT: Sternal kleft görüntüsü

Fizik Muayene → PARADOKSAL solunum hareketleri




Paradoksal solunum video


CERRAHİ ONARIM (4 aylık)




A



B



C



D

A. Sternal kleft ekspozisyonu

B. Sternal 'V' kesi hattı

C. Ve D. Sternal yakaların
birleştirilmesi



Ameliyat videosu

Postoperatif 7. ay görüntüsü



SONUÇ: Superior sternal kleft tedavisinde primer onarım kolay uygulanabilir, komplikasyon oranı düşük, fonksiyonel ve kozmetik sonuçları tatmin edici olan bir cerrahi yöntemdir. Sternum elastisitesi henüz kaybolmamış yenidoğanda uygulanması cerrahi sonuçları etkileyen bir faktördür.