

## Çocukluk Çağında İzole Dış Genital Yaralanmaların Değerlendirilmesi 5 yıllık tek merkez deneyimi

Neslihan Gülçin, Baki Murat Erkoç, Cengiz Gül, Semih L.Mirapoğlu, Ceyhan Şahin, Aytekin Kaymakçı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Türkiye, İstanbul

University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, Pediatric Surgery Department, Turkey, Istanbul

### •Amaç:

•Düşme sonrası izole dış genital yaralanma nedeniyle hastaneye yatırılarak tedavi edilen hastaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

### •Bulgular:

•-Düşme 130 hasta; 22'sinde (%17) izole dış genital yaralanma

•- 14'ü (%63,6) kız, 8'i (%36,3) erkek

•- Ortalama yaş  $6,95 \pm 2,74$  yıl

•-Hastaların 17 (%77,2) penetran yaralanma

• Kız hastalar:

-Tamamında genital bölgede kanama

-**Tamamı genel anestezi veya sedasyon altında muayene edildi.**

- Kız hastalarda perine, hymen, vajina ve labium minörlerde laserasyonlar gözlemlendi. **(Resim 1)**

-**Tedavi:** 9 hastaya primer onarım, 1 hastaya perineoplasti, 2 hastaya vajen rekonstrüksiyonu ve 1 hastada ek olarak hymenoplasti yapıldı.

-İki hastada lokal bakım yeterliydi. **(Resim 2)**

-**Cinsel taciz hikayesi veya muayene bulgusu saptanmadı.**

•-Erkek hastalar:

-5 hasta genel anestezi altında muayene

-En sık skrotal kesi, testis ödemi, glans yaralanması ve perineal laserasyon saptandı.

-**Tedavi:** 5 hastada primer onarım yapıldı.

-3 hasta lokal bakım yeterliydi. **(Resim 3)**

### Sonuç:

-Çocuklarda izole genital yaralanmalar çoğunlukla yüzeysel olup konservatif takip veya basit müdahalelerle tedavi edilebilir.

- Düşülen zemindeki sert cisimlere bağlı penetran yaralanmalarla sık karşılaşılmaktadır.

-Özellikle kızlarda yaralanmayı değerlendirmek ve tedavi yönteminin belirlenmesi amacıyla, anestezi veya sedasyon altında muayene yapılması önemlidir.

- Ayrıca bu hastaların cinsel istismar açısından dikkatli muayene edilmeleri ve sorgulanmaları önem arz etmektedir.



Resim 1: Primer onarım öncesi straddle yaralanma



Resim 2: Labial hematoma-konservatif izlem



Resim 3: Penis ve skrotumda yaygın ekimoz-konservatif izlem