

İnvajinasyonu Taklit Eden Windsock Deformitesi Ve Malrotasyon: Adölesan Dönemde Geç Tanı Almış Nadir Bir Olgu

Mehmet ŞENTÜRK*, İsmet KIRMACI*, Serpil SANCAR*
*Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Bursa, Türkiye

Giriş

Duodenal web, genellikle neonatal dönemde tanı alan nadir bir konjenital intestinal obstrüksiyon nedenidir. Bu çalışmada, invajinasyonu taklit eden windsock tipi duodenal web ve malrotasyon birlikteliğinin, adölesan dönemde tanı alan nadir bir olgusu sunulmaktadır.

Olgu sunumu

Doğumundan itibaren yalnızca sıvı gıdalarla beslenebilen, 13 yaşındaki kız hasta, giderek artan safrasız kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle başvurdu.. Ultrasonografi ve batın BT'de duodenal invajinasyon ile uyumlu bulgular saptandı. Üst GİS pasaj grafisinde ileri derecede pitotik mide izlendi.

Eksploratif laparotomi yapıldı. İntraoperatif olarak mide ve duodenumun ileri derecede dilate olduğu ve Treitz bağının sağ üst kadranda yer aldığı gözlemlendi. Duodenotomi de ortasında dar bir açıklık bulunan windsock tipi duodenal web saptandı. Web, eksize edildi. Malrotasyon nedeniyle Ladd prosedürü uygulandı. Postoperatif dönemde hasta sorunsuz iyileşti, oral alımı düzeldi ve kilo alımı gözlemlendi

Sonuç

İnvajinasyonu taklit eden windsock deformitesi ve eşlik eden malrotasyon, adölesan dönemde son derece nadir bir durumdur. Bu tip olgular, kronik kusma ve beslenme güçlüğü olan çocuklarda ayırıcı tanıda mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır

