



Çocuklarda Over Patolojilerinde Laparoskopik Organ Koruyucu Cerrahi: On Yıllık Tek Merkez Deneyimi İrem İnanç, Sadettin Yıldız, Tolga Gaş, Mustafa İnan



AMAC

Bu çalışmada, çocukluk çağında over patolojileri nedeniyle laparoskopik over koruyucu cerrahi uygulanan hastaların klinik, radyolojik ve patolojik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlandı.


YÖNTEM

2015 – 2025 arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Kliniğinde over patolojileri nedeniyle laparoskopik cerrahi uygulanan 0 – 18 yaş arası 54 olgu retrospektif olarak incelendi. Ooforektomi uygulanan 3 hasta çalışmaya dahil edilmedi. Over kisti, teratom ve/veya eşlik eden over torsiyonu sebebi ile laparoskopik organ koruyucu cerrahi yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, klinik, radyolojik, cerrahi bulguları ve patoloji sonuçları değerlendirildi. Post operatif dönemde hastalar 1, 3 ve 6 aylık aralıklarla ultrason ile takip edildi.

BULGULAR

Parametre	Değer
Hasta sayısı	54
Çalışmaya alınan hasta sayısı	51
Ortalama yaş±SD (yıl)	14±2.4
Kist boyutu ortalama±SD (mm)	75.6±31.3
Kist çapı farkı (torsiyon var/yok)	Anlamlı fark yok (p=0.776)*
Takip süresi±SD (ay)	9.9±9.1
Post-op over boyutu±SD (USG,mm)	36.1±10.5
Post-op overian atrofi	Saptanmadı

Tablo 1. Epidemiyolojik Bulgular, *Mann-Whitney U




Şekil 3. Patoloji sonuçları


SONUÇ

Cerrahi girişim gerektiren patolojilerin çoğunlukla benign karakterdedir.

Over koruyucu yaklaşımın, over fonksiyonlarının ve fertilitenin korunmasına olanak sağladığı bu nedenle çocukluk çağındaki hastalarda cerrahi tedavide ilk seçenek olması gerektiği düşüncesindeyiz.



Şekil 1. Torsiyon varlığı



Şekil 2. Pre-op tanıda kullanılan görüntülenme yöntemleri

Çalışmamızın hiçbir kurum ve kuruluşla çıkar ilişkisi veya çıkar çatışması bulunmamaktadır.