

Amaç

Glans ile penil shaft arasında oluşan cilt köprüleri, özellikle erken yaşlarda yapılan sünnet ve penil cerrahinin geç ve nadir bir komplikasyonudur. Bu çalışmada, penil cilt köprüleri nedeniyle şekil bozukluğu ya da ağrılı ereksiyon yakınmalarıyla başvuran hastaların klinik bulgu ve cerrahi tedavi sonuçlarının sunulması amaçlanmıştır.

Yöntem

Sünnet veya penil cerrahi sonrası oluşan penil cilt köprüsü nedeniyle son beş yılda başvuran olgular retrospektif olarak incelendi.



Bulgular

Penil cerrahi sonrası cilt köprüsü ile başvuran dört hasta saptandı. Başvuru yaşları 4, 6, 11 ve 14 olan olguların birinde sağ dorsal kadranda tekil, birinde sol dorsal kadranda tekil, birinde dorsal kadranda multipl, birinde ise tüm kadranda multipl cilt köprüleri mevcuttu. Hastalardan 2'si sünnet istemi, biri konjenital penil kordi, biri ise balanik hipospadias sebebiyle opere edilmiş olup sünnet yapılan iki hastaya 1 yaş altında, penil kordili hastaya 14 aylıkken, hipospadiaslı olguya ise 4,5 yaşında cerrahi işlem yapılmıştı. Hastaların tümünde şekil bozukluğu ana şikayetken, multipl cilt köprüleri olan iki hastada aynı zamanda ereksiyon sırasında ağrı şikayeti de mevcuttu. Öncesinde penil kordisi düzeltilen ve sekonder cerrahi için preoperatif hazırlığı yapılan olgu dışındaki hastaların tümü genel anestezi altında re-opere edildi. İkisine cilt köprüsü eksizyonu ile beraber primer sütürasyon, diğerine ise cilt köprüsü eksizyonu ve gerekli bölgelerde lokal flepler kullanılarak primer sütürasyon uygulandı. Opere olan tüm hastaların, postoperatif kontrolde, insizyonlarının sorunsuz iyileştiği ve ereksiyonda ağrısı olan olguların yakınmalarının düzeldiği görüldü.



Sonuç

Çocukluk çağında yapılan sünnet ve diğer cerrahi işlemler sonucu oluşan penil cilt köprüsü, kozmetik problemler dışında, ağrılı ereksiyon gibi işlevsel sorunlara da yol açabilir. Bu durumun önlenmesi için, özellikle erken yaşta sünnet veya penil cerrahi yapılan hastaların postoperatif süreçte takip edilmesi, riskli hastaların belirlenmesi ve bu hastaların özellikle erken dönemde lokal yara bakımlarının uygun şekilde yapılması önemlidir.