



Adölesan Dönemde Dev Over al Müs nöz K stadenom: Olgu sunumu

Ahmed Omar Al ¹, Amjad Khal d Abdullah Al ¹, Seç l Yüksel¹, Osman Hakan Kocaman¹,
Başak Erg nel¹

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD¹



G r ş

- Adölesan yaş grubunda over tümörler nad r görülmekte olup, bu dönemdek lezyonların yaklaşık %80’ ben gn karakterded r.(3,6)
- Ep telyal kökenl tümörler se daha az sıklıkla zlen r. Müs nöz k stadenomlar, over n ep telyal neoplaz ler arasında seröz k stadenomları tak ben en sık karşılaşılan ben gn tümörlerdend r. (1,2,3,4,5)
- Genell kle yavaş büyüyen ve asemptomat k seyreden bu tümörler, tanı konulduğunda sıklıkla dev boyutlara ulaşmıştır ve karın ç organlara bası yaparak non-spes f k semptomlara neden olab l r. (1,2)
- Bu çalışmada, adölesan dönemde nad r görülen ve dev boyutlara ulaşmış k müs nöz k stadenoma olgusu sunulmaktadır.(4,5,6)

Olgu 1

- 15 yaşında kız hasta, üç aydır devam eden karın ş ş l ğ kayet le başvurdu. F z k muayenede batında yaygın d stans yon ve batını tamamen dolduran palpabl k tle zlend .
- Laboratuvar testler nde CA 19-9 : 2509,92 U/mL olarak yüksek bulunurken, d ğer tümör bel rteçler normald .
- Abdom nal b lg sayarlı tomograf de sol overden kaynaklanan, 22×12×32 cm boyutlarında mult septalı k st k k tle saptandı. Orta hat laparotom le gerçekleştir len cerrah de, k tle sol over kökenl olarak tesp t ed ld ve sol salp ngo-ooferektom uygulandı. Postoperat f dönemde kompl kasyon gel şmed ; hasta üçüncü günde taburcu ed ld .
- H stopatoloj k sonucu ben gn müs nöz k stadenoma le uyumluydu.

Olgu 2

- 17 yaşında kız hasta, yaklaşık b r yıldır devam eden karın ş ş l ğ le başvurdu. F z k muayenede batını dolduran palpabl k tle zlend .
- Tümör bel rteçler normalken, Abdom nal b lg sayarlı tomograf de sol overden kaynaklanan 25×14×32 cm boyutlarında mult k st k septalı k tle zlend .
- Orta hat laparotom le fert l te koruyucu cerrah yaklaşım le sol over k stektom yapıldı. Postoperat f dönem sorunsuz geç t ve hasta k nc günde taburcu ed ld . Patoloj k değ erlend rme ben gn müs nöz k stadenoma le uyumluydu.

Sonuç

- Adölesan dönemde dev over k tleler n n nad r b r sebeb olan müs nöz k stadenomlar genel kle ben gn seyretmekte d r.
- Bu yaş grubunda karın ş ş l ğ g b non-spes f k semptomlarla başvuran hastalarda, dev k st k lezyonların ayırıcı tanısında müs nöz k stadenoma mutlaka düşünölmel d r.
- Tümör bel rteçler mal gn tey dıslamakta yardımcı olsa da ben gn lezyonlarda da yüksek l gözleneb l r.
- Cerrah tedav , özell kle fert l te koruyucu cerrah etk n ve güvenl b r tedav seçeneğ d r

Kaynakça

- Alkan, B., Basp nar, M., Aksoy, E., & Turan, C. (2025). A g ant ovar an muc nous cystadenoma n a postmenarchal adolescent g rl. *Turkish Journal of Pediatrics*, 67(2), 245–248.
- Bhat, S., Nayak, S. R., & Uch l, D. (2023). A rare case of muc nous cystadenoma n adolescence. *International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology*, 12(4), 1450–1452.
- Kısa, Ü., & Tek n, S. (2019). Volum nous muc nous cystadenoma of the ovary n a 13-year-old g rl: A case report. *Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology*, 32(2), e19–e21.
- Özcan, A. (2021). Ovar an muc nous cystadenoma recurred 2 years after laparoscop c surgery: A case report. *Annals of European Journal of Gynecology and Obstetrics*, 3(1), 13–16.
- Özcan, A., Yıldız, Y., & Öztürk, H. (2023). Invest gat on of the pred ct ve factors of recurrent ovar an muc nous cystadenoma. *Journal of Clinical Obstetrics & Gynecology*, 33(1), 34–39.
- S ngh, G., Sharma, R., & Verma, S. (2020). G ant muc nous cystadenoma of ovary n an adolescent g rl: A case report. *International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology*, 9(12), 5081–5083.

