

Nadir görülen bir pediatrik acil: Tubal Torsiyon


B. Arıkan Köse, M. Duman Küçükkuray, F. Serttürk, Y. Dere Günal, Ö. Çağlar
Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

GİRİŞ

Tubal torsiyonlar, overin dahil olmadan tubanın kendi etrafında dönmesi ile karakterizedir. Çocuklarda nadiren raporlanmıştır ve daha çok üreme çağındaki kadınlarda görülür. Teşhise götürecek spesifik bir bulgu veya semptomu olmadığı gibi radyolojik tetkiklerde de çoğu zaman tespit edilememektedir. Bu bakımdan tubal torsiyon nedeniyle opere edilen üç olgumuz, klinik varyasyonları göstermek amacıyla sunulmuştur.

OLGU 1


On altı yaş kız hasta, hastanemize dört günlük karın ağrısı ve çok sayıda kusma nedeni ile başvurdu. Fizik muayenesinde sağ alt kadranda hassasiyeti mevcuttu ve batin ultrasonografisinde her iki over kanlanması doğaldı, apendiks görüntülenememişti. Laparoskopik eksplorasyonda sağ tubanın 4 tur torsiyone olduğu görüldü. Tubanın gangrenöz görünümde olması nedeniyle sağ salpenjektomi yapıldı.



Olgu 1: Gangrenöze Tuba

OLGU 2

On altı yaş kız hasta, bir günlük karın ağrısı ve çok sayıda kusma nedeni ile başvurdu. Hastaya daha önce laparoskopik appendektomi yapılmıştı. Fizik muayenesinde sağ alt kadranda hassasiyeti olan hastanın ultrasonografisinde, sağ over boyutları artmış ve vaskülarizasyon sinyali alınamamıştı. Laparoskopik eksplorasyonda sağ over doğal görünümde iken sağ tubanın 2 tur torsiyone olduğu görüldü. Ödemli ve yer yer nekrotik görünümde olan tubanın dolaşımının detorsiyon sonrası düzeldiğinin görülmesi ile işleme son verildi.



Olgu 2: Nekrotik Fimbria

OLGU 3

On üç yaş kız hasta, over kisti ve bilateral hidrosalpinks nedeniyle takipli iken ani başlayan karın ağrısı nedeni ile başvurdu. Batin ultrasonografisinde sol over boyutları artmıştı ve vaskülarizasyon değerlendirilememişti. Laparoskopik eksplorasyonda her iki over doğaldı, her iki tuba hidropik ve tortiyoze görünümdeydi ve sol tuba 2 tur torsiyoneydi. Tubanın gangrenöz görünümde olması nedeniyle sol salpenjektomi yapıldı.



Olgu 3: Hidropik Tuba

SONUÇ

Tubal torsiyon, çoğu zaman cerrahi eksplorasyon esnasında tesadüfen teşhis edilmektedir. Bu nedenle, tuba çoğunlukla gangrene bir halde bulunur ve salpenjektomi yapılmalıdır ancak erken dönemde tespit edilen olgularda tuba korunabilmektedir. Alt kadrarlarda cerrahi patoloji bulgusu olan kız hastalarda, özellikle her iki over kanlanması normalse, tubal torsiyon akla gelmelidir.